

# مُدمج الدوال اللوغاريتمية والأسيّة

## السلسلة 1 (تمرینان)

التمرين الأول :

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة بما يلي :  
و ليكن  $(C_f)$  منحناها في معلم متعمد  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1) تحقق أن لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  ،  $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1$ .

2) أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ثم حدد الفرع اللانهائي بجوار  $-\infty$ .

3) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

4) تتحقق أن لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$   $f(x) = x + \ln\left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right)$  : يتم تحديده ثم بين أن  $f'(x) = \frac{\sqrt{e^x}(\sqrt{e^x} - 1)}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2}$ .

5) بين أن :  $f'(x) = \frac{\sqrt{e^x}(\sqrt{e^x} - 1)}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2}$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  ، ثم أدرس تغيرات  $f$  ووضع جدول تغيراتها.

6) بين أن :  $f''(x) = \frac{-\sqrt{e^x}((\sqrt{e^x} - 2)^2 - 2)}{2(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2}$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  ، ثم أدرس تغير  $f''(x)$  وحدد نقط الإنعطاف إن وجدت.

7) مثل مبيانيا  $(C_f)$ .

8) ناقش مبيانيا حسب قيم البارامتر  $m$  عدد حلول المعادلة :  $e^x - e^{-m} = 2(-1 + \sqrt{e^x})$

9) ليكن  $g$  قصور  $f$  على  $[0, +\infty[$


أ. بين أن  $g$  تقبل دالة عكسية  $g^{-1}$  معرفة من مجال  $J$  يتم تحديده

ب. حدد  $(g^{-1}(x))$  لكل  $x$  من  $J$

ج. مثل في نفس المعلم السابق وبلغون مغایر  $(C_{g^{-1}})$

**التمرين الثاني :**

نعتبر الدالة  $f$  للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بما يلي :  
ولتكن  $(C_f)$  منحناها في معلم متعدد منظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . (أنظر الشكل)



**الجزء الأول**

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و أول النتيجة هندسيا

(2) أ- أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب- تحقق أن  $f(x) = x + \ln(1+2e^{-x})$  يقبل مقارب مائل  $(\Delta)$  معادلته  $y = x$  بجوار  $+\infty$

(3) أدرس تغيرات  $f$  ثم ضع جدول تغيراتها

**الجزء الثاني**

نضع  $I = \int_2^3 |f(x) - x| dx$

(1) أدرس الوضع النسبي ل  $(C_f)$  و  $(\Delta)$  و مثل  $(\Delta)$  في الشكل أعلاه

(2) اعط تأويلا هندسيا ل  $I$

(3) أ- بين أن لكل  $t$  من  $[0, +\infty]$   $\ln(1+t) \leq t$

ب- استنتج أن لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$   $\ln(1+2e^{-x}) \leq 2e^{-x}$

ج- بين أن :  $0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-x} dx$

د- أحسب  $I$  و استنتاج تأطيرا ل  $I$  سعته  $0,2$   $\int_2^3 2e^{-x} dx$

## تصحيح التمرين الأول

:  $x \in \mathbb{R}$  ليكن (1)

$$e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x})^2 - 2\sqrt{e^x} + 1 + 1 = (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1 \text{ لدينا :}$$

إذن : لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

من الواضح أن : لكل  $x$  من  $(\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1 > 0$

إذن

$$D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} / e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 > 0 \right\}$$

$$= \left\{ x \in \mathbb{R} / (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1 > 0 \right\}$$

$= \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) = \ln 2 \quad (2)$$

لأن :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = 2$  و الدالة  $\ln$  متصلة في 2.

التأويل الهندسي :  $y = \ln 2$  يقبل مقارباً أفقياً معادله  $y = \ln x$  بجوار  $-\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln((\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1) = +\infty \quad (3)$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{cases} \text{ لأن :}$$

:  $x \in \mathbb{R}$  ليكن (4) ✓

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) \\
 &= \ln\left(e^x \times \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right)\right) \\
 &= \ln(e^x) + \ln\left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right) \\
 &= x + \ln\left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right) \\
 f(x) &= x + \ln\left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right) : \text{إذن: لكل } x \text{ من } \mathbb{R} \\
 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right) = \ln 1 = 0 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

لأن:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x}\right) = 1$

التأويل الهندسي:  $(C_f)$  يقبل مقاربامائلا معادلته  $y = x$  بجوار  $+\infty$

(5) الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق على  $\mathbb{R}$  ( مركب دالتين قابلتين للاشتقاق على  $\mathbb{R}$  و  $0 > e^x - 2\sqrt{e^x} + 2$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  )

ليكن  $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left( \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) \right)' \\
 &= \frac{(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)'}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2} \\
 &= \frac{e^x - 2 \cdot \frac{(e^x)'}{2\sqrt{e^x}}}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2} \\
 &= \frac{e^x - \frac{e^x}{\sqrt{e^x}}}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2} \\
 &= \frac{e^x - \sqrt{e^x}}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2} \\
 &= \frac{\sqrt{e^x}(\sqrt{e^x} - 1)}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2}
 \end{aligned}$$

$$\text{إذن: } f'(x) = \frac{\sqrt{e^x}(\sqrt{e^x} - 1)}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2}$$

لدينا:  $\sqrt{e^x} > 0$  و  $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 > 0$

إذن إشارة  $f'(x)$  هي إشارة  $\sqrt{e^x} - 1$

$$\begin{aligned}
 f'(x) = 0 &\Leftrightarrow \sqrt{e^x} - 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow e^x = 1 \\
 &\Leftrightarrow x = 0
 \end{aligned}$$

$x$	$-\infty$	0	$+\infty$
$\sqrt{(ex)-1}$	-	0	+

 جدول تغيرات  $f$  :

$x$	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\ln 2$	0	$+\infty$

 :  $x \in \mathbb{R}$  ليكن (6)

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{\sqrt{e^x} (\sqrt{e^x} - 1)}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2}' \\
 &= \frac{e^x - \sqrt{e^x}}{e^x - 2\sqrt{e^x} + 2}' \\
 &= \frac{(e^x - \sqrt{e^x})' (e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) - (e^x - \sqrt{e^x}) (e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)'}{(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2} \\
 &= \frac{\left(e^x - \frac{\sqrt{e^x}}{2}\right) (e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) - (e^x - \sqrt{e^x}) (e^x - \sqrt{e^x})}{(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2} \\
 &= \frac{e^{2x} - 2e^x \sqrt{e^x} + 2e^x - \frac{e^x \sqrt{e^x}}{2} + e^x - \sqrt{e^x} - e^{2x} + 2\sqrt{e^x} e^x - e^x}{(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2} \\
 &= \frac{2e^x - \frac{e^x \sqrt{e^x}}{2} - \sqrt{e^x}}{(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2} \\
 &= \frac{-\sqrt{e^x} (-4\sqrt{e^x} + e^x + 2)}{2(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2} = \frac{-\sqrt{e^x} \left(\left(\sqrt{e^x}\right)^2 - 4\sqrt{e^x} + 4 - 2\right)}{2(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2}
 \end{aligned}$$

$$\mathbb{R} \text{ لكل } x \text{ من } \mathbb{R} : f''(x) = \frac{-\sqrt{e^x} \left( (\sqrt{e^x} - 2)^2 - 2 \right)}{2(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2} ; \text{ إذن } C_f \text{ تغير لندس}$$

لدينا :  $2(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)^2 > 0$  و  $\sqrt{e^x} > 0$

$x$	$-\infty$	$2\ln(2-\sqrt{2})$	$2\ln(2+\sqrt{2})$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+	0

على المجال  $[-\infty, 2\ln(2-\sqrt{2})]$  م-curv ( $C_f$ )


على المجال  $[2\ln(2-\sqrt{2}), 2\ln(2+\sqrt{2})]$  م-hab ( $C_f$ )

على المجال  $[2\ln(2+\sqrt{2}), +\infty]$  م-curv ( $C_f$ )

و بما أن  $f''$  تتعدم و تغير إشارتها عند  $I \left( 2\ln(2-\sqrt{2}), f \left( 2\ln(2-\sqrt{2}) \right) \right)$  هي نقطة انعطاف

و كذلك  $f''$  تتعدم و تغير إشارتها عند  $J \left( 2\ln(2+\sqrt{2}), f \left( 2\ln(2+\sqrt{2}) \right) \right)$  هي نقطة انعطاف

(7)



$$(x \in \mathbb{R}) \quad e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = e^m \quad \text{تكافى} \quad (x \in \mathbb{R}) \quad e^x - e^m = 2(-1 + \sqrt{e^x}) \quad (8) \quad \text{المعادلة}$$

$$(x \in \mathbb{R}) \quad \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2) = m \quad \text{تكافى}$$

$$(x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = m \quad \text{تكافى}$$

✓ إذا كان  $m < 0$  : المعادلة لا تقبل حل

✓ إذا كان  $m = 0$  : المعادلة لها حل وحيدا

✓ إذا كان  $0 < m < \ln 2$  : المعادلة تقبل طلين

✓ إذا كان  $m \geq \ln 2$  : المعادلة لها حل وحيدا


(9) أ- لدينا  $g$  متصلة و تزايدية قطعا على المجال  $[0, +\infty[$  ( لأن  $g$  قصور  $f$  على المجال  $[0, +\infty[$  )

إذن  $g$  تقبل دالة عكssية  $g^{-1}$  معرفة من المجال  $[0, +\infty[$  نحو

ب- ليكن  $x \in [0, +\infty[$

$$\begin{aligned}
 y = g^{-1}(x) &\Leftrightarrow x = g(y) \\
 &\Leftrightarrow x = \ln\left(\left(\sqrt{e^y} - 1\right)^2 + 1\right) \\
 &\Leftrightarrow e^x = \left(\sqrt{e^y} - 1\right)^2 + 1 \\
 &\Leftrightarrow e^x - 1 = \left(\sqrt{e^y} - 1\right)^2 \\
 &\Leftrightarrow \left|\sqrt{e^y} - 1\right| = \sqrt{e^x - 1} \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{e^y} - 1 = \sqrt{e^x - 1} \quad (y \geq 0) \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{e^y} = 1 + \sqrt{e^x - 1} \\
 &\Leftrightarrow e^y = \left(1 + \sqrt{e^x - 1}\right)^2 \\
 &\Leftrightarrow y = \ln\left(\left(1 + \sqrt{e^x - 1}\right)^2\right) \\
 &\Leftrightarrow y = 2 \ln\left(1 + \sqrt{e^x - 1}\right) \\
 g^{-1}(x) &= 2 \ln\left(1 + \sqrt{e^x - 1}\right) : [0, +\infty[ \quad \text{إذن لكل } x \text{ من }
 \end{aligned}$$

-٢



تصحيح التمرين الثاني

الجزء الأول :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^x + 2) = \ln(2) \quad (1)$$

لأن  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  و الدالة  $\ln$  متصلة في 2

التأويل الهندسي : يقبل مقارباً أفقياً معادلة  $y = \ln 2$  بجوار  $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^x + 2) = +\infty \quad (2)$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + 2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \end{cases} \text{ لأن :}$$

ب- ل يكن  $x \in \mathbb{R}$

✓

$$f(x) = \ln(e^x + 2) = \ln\left(e^x \left(1 + \frac{2}{e^x}\right)\right) = \ln(e^x) + \ln\left(1 + \frac{2}{e^x}\right) = x + \ln\left(1 + 2e^{-x}\right)$$

إذن :  $f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-x})$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + 2e^{-x}) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \ln(1 + 2e^t) = \ln(1) = 0 \quad \checkmark$$

لأن : 1 و الدالة  $\ln$  متصلة في 1

التأويل الهندسي : يقبل مقارباً مائلًا معادلة  $y = x$  بجوار  $+\infty$

(3) لندرس تغيرات الدالة  $f$

الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق على  $\mathbb{R}$  (مركب دالتين قابلتين للاشتقاق على  $\mathbb{R}$  و  $e^x > 0$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$ )

ل يكن  $x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = (\ln(e^x + 2))' = \frac{(e^x + 2)'}{e^x + 2} = \frac{e^x}{e^x + 2}$$

من الواضح أن  $e^x > 0$   $f'(x) > 0$

إذن  $f$  تزايدية قطعاً على  $\mathbb{R}$

جدول تغيرات  $f$  :

$x$	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$\ln 2$	$+\infty$


الجزء الثاني :

:  $x \in \mathbb{R}$  ليكن (1)

$$f(x) - x = \ln(1 + 2e^{-x})$$

نعلم أن  $0 > 2e^{-x} > 1$  إذن  $\ln(1 + 2e^{-x}) > 0$  إذن  $1 + 2e^{-x} > 1$  إذن  $2e^{-x} > 0$  إذن

و منه (C<sub>f</sub>) يوجد فوق ( $\Delta$ )



(2) التكامل  $I = \int_2^3 |f(x) - x| dx$  هو مساحة الحيز المحصور بين (C<sub>f</sub>) و المستقيم ( $\Delta$ ) ذي المعادلة  $y = x$  و المستقيمين اللذين معادلتها  $x = 2$  و  $x = 3$

أ- لتبين أن لكل  $t$  من  $[0, +\infty]$  :

نعتبر الدالة  $u : t \mapsto \ln(1+t) - t$

$$u'(t) = (\ln(1+t) - t)' = \frac{1}{1+t} - 1 = \frac{1-1-t}{1+t} = \frac{-t}{1+t}$$

لدينا  $0 \leq t \leq 0$  إذن  $u'(t) \leq 0$  و منه الدالة  $u$  تناقصية

وبما أن  $t \geq 0$  فان  $u(t) \leq u(0)$

و بالتالي :

$\ln(1+t) - t \leq 0$  نستنتج أن لكل  $t$  من  $[0, +\infty]$

ب- لدينا لكل  $t$  من  $[0, +\infty]$

و بنا أن لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  :

$$\ln(1+2e^{-x}) \leq 2e^{-x} \quad \text{فإن :}$$

ج- لدينا : لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

$$0 \leq \int_2^3 \ln(1+2e^{-x}) dx \leq \int_2^3 2e^{-x} dx$$

$$(f(x) - x = \ln(1+2e^{-x}) > 0) \quad 0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-x} dx \quad \text{و منه}$$

-٤

$$\int_2^3 2e^{-x} dx = 2 \int_2^3 e^{-x} dx = 2 \left[ -e^{-x} \right]_2^3 = 2(e^{-2} - e^{-3}) \quad \checkmark$$

$$0 \leq I \leq 2(e^{-2} - e^{-3}) \quad \checkmark$$

$$0 \leq I \leq 2(e^{-2} - e^{-3}) \leq 0,2$$

و هذا تأطير سعنه 0,2

つづく

math.ma