

المُتتاليات العدّدية

١. تذكير:

أ. المتتاليات الحسابية:

تعريف:

$$(u_n) \text{ حسابية } r \text{ أساس } u_{n+1} - u_n = r \Leftrightarrow (u_n)$$

كتابة بدلالة (u_n)

$$u_n = u_p + (n-p)r$$

$$u_n = u_p + (n-p)r$$

$$u_n = u_1 + (n-1)r$$

حساب المجموع:

$$u_p + u_{p+1} + \dots + u_m = (m-p+1) \cdot \left(\frac{u_p + u_m}{2} \right)$$

ب. المتتاليات الهندسية:

تعريف:

$$(v_n) \text{ هندسية } q \text{ أساس } v_{n+1} = q \cdot v_n \Leftrightarrow (v_n)$$

كتابة بدلالة v_n
 $v_n = v_p \cdot q^{n-p}$

$$v_n = v_0 \cdot q^n$$

$$v_n = v_1 \cdot q^{n-1}$$

حساب المجموع :

$$v_p + v_{p+1} + \dots + v_m = v_p \cdot \frac{1-q^{m-p+1}}{1-q}$$

ج. رتبة متالية :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &\geq 0 \Leftrightarrow (u_n) \text{ تزايدية} \\ u_{n+1} - u_n &\leq 0 \Leftrightarrow (u_n) \text{ تناقصية} \\ u_{n+1} = u_n &\Leftrightarrow (u_n) \text{ ثابتة} \end{aligned}$$

د. متالية مصغورة - مكبورة - محدودة

$$\begin{aligned} m \leq u_n &\Leftrightarrow m \text{ مصغورة بالعدد } (u_n) \\ u_n \leq M &\Leftrightarrow M \text{ مكبورة بالعدد } (u_n) \\ m \leq u_n \leq M &\Leftrightarrow M \text{ محدودة } (u_n) \end{aligned}$$

2. نهاية متالية :
أ. تعاريف:

نقول أن نهاية المتالية (u_n) هي العدد الحقيقي l إذا كان كل مجال مفتوح مركزه l يحتوي على جميع الحدود u_n ابتداءً من رتبة معينة و نكتب : $\lim u_n = l$ أو $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$

ب. أمثلة اعتيادية :

$$(p \in \mathbb{N}^*) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^p = +\infty \quad (1)$$

$$(p \in \mathbb{N}^*) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^p} = 0 \quad (2)$$

ج. خاصية :

إذا كانت (u_n) تقبل نهاية فإن هذه النهاية تكون وحيدة .

د. تعاريف و مصطلحات :

- نقول إن (u_n) متقاربة إذا كانت تقبل نهاية منتهية
- نقول إن (u_n) متباعدة إذا كانت تقبل نهاية لا منتهية أو لا تقبل نهاية

3. العمليات على النهايات :
خاصيات :

لتكن (u_n) و (v_n) متاليتان متقاربتان لدينا :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) + \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) \quad \bullet$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) \times \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) \quad \bullet$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{u_n} \right) = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)} \quad \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq 0 \right) \quad \bullet$$

• ملاحظة : الخاصيات بالنسبة للعمليات على النهايات غير المنتهية هي نفسها على الدوال العددية

4. النهايات والترتيب :
خاصيات

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \iff \begin{cases} v_n \leq u_n \leq w_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l \end{cases} \quad (1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha \iff \begin{cases} |u_n - \alpha| \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty \iff \begin{cases} u_n \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \end{cases} \quad (3)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \iff \begin{cases} u_n \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty \end{cases} \quad (4)$$

5. نهاية المتالية (q^n)

خاصية:

لا تقبل نهاية $(q^n) : q \leq -1$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0 : -1 < q < 1$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1 : q = 1$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty : q > 1$

خاصية:

- » كل متالية تزايدية و مكبورة فهي متقاربة
- » كل متالية تناظرية و مصغررة فهي متقاربة

6. نهاية المتالية (n^r) $(r \in \mathbb{Q}^*)$

خاصية

إذا كان $r > 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^r = +\infty$

إذا كان $r < 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^r = 0$

7. نهاية متالية من نوع $v_n = f(u_n)$

خاصية:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = f(l) \Leftarrow l \text{ متصلة في } f \text{ و } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$

8. نهاية متتالية من نوع $u_{n+1} = f(u_n)$

خاصية:

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

إذا كانت $f(I) \subset I$ و (u_n) متقاربة
فإن نهاية $f(x) = x$ هي حل للمعادلة

ملاحظة:

- ❖ إذا كانت (u_n) تنقصصية فإن $u_n \leq u_0$
- ❖ إذا كانت (u_n) تزايدية فإن $u_0 \leq u_n$